

MORA® vaka incelemesi: Felcin Etkileri

Alternatif Hekim Francine Delvaux tarafından hazırlanan rapor

Kullanılan MORA® cihazı:
MORA® Nova

Klinik teşhis:
Felç sonrası şikayetler (tromboz kaynaklı)

Yaş: 77
Cinsiyet: Kadın
Meslek: Emekli doktor

Tedavi süresi: 01/14 – 06/14

Terapi seanslarının sayısı: 9
(İki üç seans, dört gün sürdü.
Hastanın durumuna göre daha sonra kısa süreli olarak devam etti.)

Kısa hastalık geçmişi (temel semptom):
Paraliz (sol), ciddi konuşma sorunları (kekemelik), idrar kaçırma

Bulgular:
Bir EAP testi, çoğu nokta için değerlerin normal aralığın altında olduğunu göstermiştir. Sinir sistemi ve kardiyovasküler meridyen ile ilgili noktalar özellikle düşüktür (EAP'da ölçülebilir değildir).
Kan testi sonuçları: Yüksek kan şekeri ve kolesterol.

Holistik teşhis:
Onlarca yıldır obez.
Bir önceki yıla ait tam diş çekimi yaraları ve kırık kemikler (parmak). Bunlar, kardiyovasküler meridyenleri etkiler.

Tedavi süreci ve tedavi önlemleri:

- 1. seans: Yaraların tedavisi (diş çekimi ve kırık parmak). Yaralar, BlueMag S elektrotlu program 149 ile tedavi edildi. Bunu, paraliz programı izledi.
- 2. seans: Paraliz programının ardından karaciğer ve safra kesesi drenaj programına geçildi
- 3. seans: Paraliz programı
- 4. seans: Paraliz programının ardından uykusuzluk programına geçildi
- 5. seans: Paraliz programının ardından karaciğer

ve safra kesesi drenaj programına geçildi

- 6. seans: 5. seanstaki tedavi tekrarlandı
- 7. seans: Paraliz programı
- 8. seans: Yaraların tedavisi (diş çekimi ve kırık parmak). Yaralar, BlueMag S elektrotlu program 149 ile tedavi edildi. Bunu, paraliz programı izledi.
- 9. seans: Paraliz programının ardından karaciğer ve safra kesesi drenaj programına geçildi

Programların hepsi, psiko-biyofon modülündedir.

Nedensel faktörler:

Olası neden: Kardiyovasküler sistemdeki (yaralardan kaynaklanan) enerji bloklarından kaynaklanan tromboz.

Semptomatik:

- 1. seanstaki sonra önemli iyileşme; konuşma ile ilgili sorunlarda azalma.
- 3. seanstaki sonra hasta, iç huzuruna ve iyi uyku kalitesine kavuştu.
- 4. seanstaki sonra, etkilenen kol ve bacak hareketlerinde önemli derecede iyileşme oldu.
- Pozitif sonuçlar fizyoterapide doğrulandı.
- MORA® tedavisinin 6. seansından sonra, hastanın hareket sorunları, % 80 oranında iyileşti.
- 7. seanstaki sonra, idrar kaçırma sorunu tedavi edildi.

Dört ay sonra, hasta bağımsızlığını geri kazandı.

Yan etkiler ve intoleranslar:
Yok

Başka ilave tedavi önlemleri (ör. ilaçlar vb.) kullandı mı? Kullanıldıysa hangileridir?

Şeker ve yağ içermeyen, az miktarda et, glüten ve peynir ile çok miktarda meyve ve sebze içeren bir diyet uygulandı.

MORA® terapisinin tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi:



Alternatif hekim Francine Delvaux
Fransa
Email: delvaux.mora@gmail.com