

Borelyoz tanısı ve Tedavisi.

## **Lyme Hastalığı –Foton Terapisi tedavisi ve tanısı ile ilgili öneriler**

### **Tanı**

1. Önerilen labaratuvar testleri : Lenfosit Transformasyon Testi (LTT), örneğin şu adreslerde: Ettlingen Laboratory, Dr. Gebhard or Infectolab, Augsburg, Dr. Schwarzbach. Testler ayrıca klamidy, Chlamydia, Ehrlichia, Babeziya, Yersinia, ve Mikoplazma gibi bakterilerin neden olduğu birçok enfeksiyon için de önerilmektedir..
2. Eğer gerek görülür ise karanlık alan mikroskopisi
3. Her türlü Lyme hastalığı için ve birçok enfeksiyon için enrji testi. Örneğin biyotensor,kinesiyoloji testi, biorezonans gibi. Buschkuehl GmbH 'nin geliştirdiği Borelyoz Test kiti.
4. Ağır metal testleri
5. Mantarı teşhis etmek için gaita testi
6. Asit/Baz dengesinin kontrolü.

### **Tedavi**

1. Detoksifikasyon ve Deasidifikasyon: Foton terapisinden önce mümkün olan her fırsatta organların toksin atımını aktive etmek ve toksinlerin vücutta birikmesini önlemek amacıyla yapılır.

#### **Oral detoksifikasyon ve deasidifikasyon**

Bu süreç foton terapi tedavisine başlanmadan en az 3 ay önceden başlar ve infüzyonlar sonrasında bile devam eder.Oral tedavi infüzyon tedavisi sırasında durdurulmalıdır.

- Derivatio tabletleri (üretici : Pflueger): 3 x 1 – günde 2 tablet
- Lactopurum (üretici : Pflueger): 3 x 30 damla/ gün
- Lymphaden (üretici : Hevert): 3 x 30 damla / gün
- Glutasyon , örneğin. L-glutamine tozu günde 1 çay kaşığı
- Ferulith (entegre nitrostress düzenleyici ,üretici : Viathen) dozajı talimatlara göre ayarlanır.
- Alternatif olarak Zeolithe (Montilo Froximun veya Energywell kapsülleri veya tozu )dozajı talimatlara göre ayarlanır.
- Viathen, (üretici : Viathen) enflamasyon başlangıcına eşlik eden kronik hastalıklarda, dozajı talimatlara göre ayarlanır.

## **Parenteral detoksifikasyon ve deasiditasyon**

Aşağıdaki preparatlar foton terapisi ile birlikte veya öncesinde haftada iki kere kullanılmalıdır:

- Bir ampul Glutathion IV. (Ridutox 600mg. / Foerster Apotheke Tel. 040-8504024), sonrasında 500 NaCl infuzyonu, 100 ml. bikarbonat veya 10 ampul 5ml. Lactopurum (üretici : Pflueger)
- Çinko 10 ml.
- Magnezyum 10 ml.
- Lymphaden (üretici : Hevert) 2ml.
- Solidago comp. (üretici Heel) 3ml.
- Hepar comp. (üretici Heel) 2ml.
- Derivato (üretici : Pflueger) 5 ml.

Bionic foton terapide önceden test edilmiş veya bilinen (H. Buschkuehl GmbH. Tel. 0211-253186) borelya nosodları kullanılmalıdır.

## **Foton terapide aşağıdaki yönergeler kullanılmıştır:**

Kullanım sıklığı : Haftada iki kez

Frekans: 9.88 Hz (çoğunlukla) veya 11.77 Hz (muayeneden sonra)

Süre : Her bir nokta için 325 saniye

Nosodlar : Genelde borelya burgdorferi D 5 – D 200 + Borelya afzelii (H. Buschkuehl GmbH), ya da başka bir tür borelya. Çeşitli enfeksiyonlara muhakkak dikkat edin.

Nozodlar terapi boyunca sternum'un biraz altına yerleştirilmelidir. ( leukozyl ile sabitlenir).

Her bir hasta kendi nozodlarına ihtiyaç duyar, bu yüzden bir hastada kullanılan nozod başka bir hastada kullanılmamalıdır.

Sadece Bionic Transducer cihazı kullanan terapistler nozodları başka hastalar üzerinde kullanabilirler.